



Grandes Cultures

désherbage pour la qualité de l'eau, maladies et parasites

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°21 du 04 Octobre 2006 - 1 page

La mise en oeuvre du suivi phytosanitaire nécessaire pour la réalisation de ces bulletins est effectuée par la DRAF-SRPV et la FEREDDEC de Bretagne. Elle bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne.



Prochain
bulletin : Le 12
Octobre.

COLZA

**Stades : levées irrégulières à 8-9
feuilles**

Tableau 1 : observations du réseau cette semaine

	département	Stade	cumul altises	observations
Ploumagoar	22	levées irrégulières	1	
Trevron	22	B2		nombreuses morsures altises
	22	B3		quelques pieds disparus (limaces)
Lanrivaroé	29	B2-3	2	1 à 2 tenthrèdes/m2, nombreuses limaces
Tregarantec	29	B4	2	fortes attaques limaces
Domloup	35	B6	4	ras
St Grégoire	35	A-B3	7	dégâts limaces sur pieds peu développés
La Bouexière	35	B2-B7	6	
Lalleu	35	B8-B9	0	colza dense
Etelles	35	B2-3	22	attaques limaces
Taupont	56	B4-6	0	larves et dégâts de tenthrèdes bien visibles
Campeneac	56	B6	20	larves et dégâts de tenthrèdes bien visibles

Limaces :

Ce ravageur bénéficie toujours de conditions très favorables à son activité. Les sols étant humides uniformément, il est possible de ne pas retrouver de limaces dans les pièges alors qu'elles font des dégâts sur la culture.

Rester vigilant pour les cultures peu développées et assurer une protection au besoin, en se limitant éventuellement aux secteurs de la parcelle les plus à risque (zones de levées tardives...).

Pucerons verts et cendrés :

Les infestations progressent mais ne sont pas préoccupantes.

Ne pas intervenir

Grosses Altises :

Les vols, perturbés par les conditions climatiques, ne dépassent toujours pas le seuil d'intervention sur les parcelles du réseau.

Pas d'intervention spécifique à prévoir actuellement dans la majorité des situations.

Tenthrèdes de la rave :

Les larves se manifestent actuellement parfois de manière spectaculaire, notamment sur des couverts de colza fourrager (secteur de Quimperlé, de Taupont...). Sur les parcelles de colzas du réseau, les 2 parcelles du Morbihan ont des populations larvaires importantes.

Une protection peut s'avérer nécessaire si le risque de défoliation est trop important : prendre en compte le niveau de population (à partir du seuil de 10 individus par m2) et le développement végétatif la culture.

Colza :
attention aux li-
maces et
tenthrèdes.

026277032420004830202

© SPV Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation

DRAF Bretagne
Service Régional de la
Protection des Végétaux
280, rue de Fougères
35700 RENNES

Imprimé à la station
D'Avertissements Agricoles
de Rennes
Directeur gérant :
P. MICHON
Publication périodique
C.P.P.A.P n°528 AD
ISSN n°1167-2382



D3 50 50 48827

728